



WEBER SHANDWICK

Ritaglio Stampa

Testata: Asca

Città: Italia

Data: 24 Novembre 2011

Soggetto: XLVIII Congresso Nazionale di Reumatologia



SALUTE: ARTRITE REUMATOIDE, A SUD LIVELLI VITAMINA D INSUFFICIENTI

(ASCA) - Roma, 25 nov - Esistono differenze significative dei livelli di Vitamina D nelle diverse regioni italiane tra le persone affette da [Artrite Reumatoide](#), con una sorprendente prevalenza di insufficienza nel Sud Italia, nel periodo primaverile. E' quanto emerge da uno studio multicentrico su 581 pazienti in 22 centri equamente distribuiti in tutta Italia, presentato in occasione del Congresso Nazionale della Societa' Italiana di Reumatologia (Sir) in corso a Rimini e realizzato dal Gruppo Sir per lo Studio dell'[Osteoporosi](#) e delle Malattie Metaboliche dello Scheletro.

"Nonostante da questo punto di vista l'Italia abbia una posizione geografica favorevole rispetto ad altri Paesi Europei, si rileva una prevalenza di insufficienza di Vitamina D superiore alla media europea, se si considerano i Paesi alla stessa latitudine - ha spiegato Giovanni Minisola, presidente della Sir e direttore della Divisione di Reumatologia dell'Ospedale "San Camillo" di Roma -. Secondo lo studio presentato al Congresso Sir, nei pazienti affetti da [Artrite Reumatoide](#) delle regioni del Nord Italia sembrano influire positivamente sui livelli di Vitamina D la maggiore esposizione ai raggi solari, indici di attivita' di malattia migliori, minore grado di disabilita' e valori piu' bassi di Bmi (Indice di massa corporea). A questo proposito si e' osservato che in soggetti con valori di Bmi superiore a 30, riscontrabili nelle persone obese, i livelli di Vitamina D sono notevolmente ridotti". noe/cam/aif